



Grandes cultures

BULLETIN N° 445 DU 18 OCTOBRE 1988 - ENVOI N° 27

ORGE D'HIVER : - Les premiers pucerons sont là : intervenir
- des dégâts de limaces .
COLZA : - Situation ravageurs .

ORGE D'HIVER - ESCOURGEON

STADE : 2 feuilles à début germination .

PUCERONS ET JAUNISSE NANISANTE :

● **Situation** : Les premiers pucerons ailés sont arrivés sur les orges semées les plus précocement (stade 1 à 2 feuilles actuellement). On trouve déjà des petites colonies (pucerons globuleux de couleur vert à brun). Le pourcentage de pieds atteints varie entre 0 et 15% : fréquence élevée dans le centre et le sud de la SEINE & MARNE.

● **Préconisation** : SURVEILLER ATTENTIVEMENT les orges qui lèvent, aux heures chaudes de la journée . Intervenir dès qu'un pied sur 10 au moins porte un puceron.

La surveillance devra se poursuivre tout l'automne jusqu'aux grands froids.

● **Mélanges avec les herbicides :**

Si les mélanges permettent une économie de temps et de travail, il faut être vigilant et vérifier les compatibilités avant utilisation.

● **Produits utilisables :**

Matière active	Spécialités commerciales	Dose en l/ha
alphaméthrine	Fastac	0,2 l
biphenthrine	Talstar	0,075 l
bromophos	Nexion 25	1,5 l
cyalothrine	Karaté	0,15 l
cyfluthrine	Baythroid	0,3 l
cyperméthrine	Cymbush	0,2 l
	Kafil super	0,2 l
	Mastor	0,4 l
	Sherpa 10	0,2 l
deltaméthrine	Decis C E	0,3 l
esfenvalérate	Sumialpha	0,25 l
fenvalérate	Sumicidin 10	0,25 l
fluvalinate	Mavrik	0,2 l

752



■ LIMACES : de nombreux dégâts sur les jeunes orges levées.

Précautions d'utilisation des granulés : pour éviter les accidents avec les animaux domestiques et le gibier et améliorer l'efficacité des produits : répartir de façon homogène 25 à 30 granulés/M2 , en évitant une disposition en tas ou en ligne.

C O L Z A

■ STADE levée à 5 feuilles .

■ LIMACES à surveiller jusqu'au stade 4 feuilles . Produits utilisables :

- * MESUROL 3 kg/ha
- * métaldéhyde 15 à 30 kg/ha
- * SKIPPER à 5 kg/ha

■ CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL:

- Situation : Depuis plusieurs années, ce ravageur est rarement présent dans notre région (En 1988, il est signalé dans le secteur de BRAY SUR SEINE , en SEINE & MARNE avec des infestations très faibles), alors que les régions voisines (CENTRE et CHAMPAGNE ARDENNES) signalent régulièrement l'arrivée de cet insecte.
- Préconisation : Aucune capture n'a été enregistrée cette année. Toutefois, surveiller les pièges.
Un traitement peut s'envisager 10 à 15 jours après les premières captures , si le colza a atteint le stade "3 feuilles vraies".

■ MOUCHE DU CHOU

- Situation : Ce ravageur s'observe sur des semis précoces : galeries souvent superficielles sur la racine principale. Lorsque des jeunes pieds sont atteints, le pivot peut parfois être sectionné.
- Préconisation : Aucune intervention en végétation . Seuls les traitements insecticides du sol ont une efficacité.

A NOTER : A la fin du mois de décembre, une brochure " essais grandes cultures : résultats nationaux et régionaux " sera disponible au prix de 44 FRS payables en timbres poste.

Les Avertissements Agricoles
c'est aussi :

- sur TF1 à 6h30 ;
- Sur minitel :

36-17 code AVERT

36-16 code AGRIF (pour les départements 78 - 91 et 95).

